



## มะกล่ำตาไก่ CORAL WOOD

มะกล่ำตาไก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Adenanthera pavonina* L. var. *microsperma* (Teijsm. & binn.) Nielsen ชื่อเรียกอื่น : บนชี โฟ  
ชื่อวงศ์ : FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)

ลักษณะ : ไม้ต้นสูง 15 เมตร ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบย่อยเรียงสลับ รูปรี กว้าง 1.1-1.5 ซม. ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อ กลีบ  
เลี้ยงรูปถ้วย ยาว 0.5-0.8 มม. ปลายแยกเป็นแฉกสั้น 5 แฉก กลีบดอกรูปขนานแกมรูปใบหอก ยาว 2-3 มม. รังไข่รูปขอบขนาน ยาว  
1.5-2.5 มม. มีขน ฝัก แห้งแตก รูปแถบบิด กว้าง 8-12 มม. เมล็ดรูปกลมจนถึงรูปรี สีแดง สด กว้าง 4.5-7 มม. ยาว 5-8 มม.  
การกระจายพันธุ์ : พบตามป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ หรือตามชายป่าหรือที่เปิด ที่ระดับความสูงไม่เกิน 700 เมตร ออกดอกเดือน เม.ย.  
ผลแก่เดือน ต.ค. ประโยชน์ : ยอดอ่อนลวกรับประทานกับน้ำพริก เมล็ดมีพิษ

**CORAL WOOD** Scientific name : *Adenanthera pavonina* L. var. *microsperma* (Teijsm. & binn.) Nielsen Other names :  
Once PiFamily name : FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE) floor Sub-leaves alternate, elliptical, 1.1-1.5  
cm wide; flowers yellow; calyx cup-shaped, 0.5-0.8 mm long; 5-lobed short lobes; petals lanceolate, 2-3 mm long.  
Ovary oblong, 1.5-2.5 mm long, hairy; pod dry, cracked, twisted, 8-12 mm wide; seeds round to oval, bright red, 4.5-7  
mm wide, 5-8 mm long. distribution : Found in the evergreen forest, mixed forest or along the edge of the forest  
or open area. At an altitude of not more than 700 meters, flowering in April, fruiting in October. Benefits : Soft-boiled  
shoots are eaten with chilli paste. The seeds are poisonous.