



## ปออีแก้ง TALUTO

ปออีแก้ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr. ชื่อวงศ์ MALVACEAE ชื่ออื่น ๆ ปออีลีน (หนองคาย) ปออีเลียด (เชียงใหม่ สระบุรี) ปออีแฮด (เชียงใหม่ เหนือ) กะพงใหญ่ (ระยอง) กุลูกะแปงบุง (มลายู ปัตตานี) ดางชุง (พิษณุโลก) คำโรง (มลายู ปัตตานี) บอนครั่ง (ระนอง) ปง (สุราษฎร์ธานี) ปอกระด้าง (ภาคเหนือ) ปออีไก่ (สุโขทัย) ปออีแตก ชื่อสามัญ Taluto. ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นผลัดใบขนาดใหญ่ สูง 20-30 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกนอกสีน้ำตาลเทา เปลือกเรียบหรือมีตุ่มกระจายทั่วลำต้น เปลือกในสีน้ำตาลแดงสลับขาว เปลือกหนา 3-5 เซนติเมตร ใบเดี่ยว เรียงเวียน ใบรูปไข่หรือรูปหัวใจ กว้าง 5-8 เซนติเมตร ยาว 10-15 เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม โคนใบรูปปลีหรือมนหรือรูปหัวใจ ขอบใบเว้าเป็นลอนหรือเป็นคลื่น ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง เกิดตามกิ่งหรือที่ปลายกิ่ง ดอกสีเขียวอ่อน กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปประขัง ปลายกลีบแยกเป็น 5 แฉก กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 2 เซนติเมตร พูกลีบเลี้ยงยาวเท่ากับหลอดกลีบ ไม่มีกลีบดอก แกนเกสรเพศผู้มีขนสีขาวที่ฐาน ผลยาว 5-6 เซนติเมตร สีเทาดำ 3-5 ผลต่อ 1 ก้าน แต่ละผลมี เปลือกบางคล้ายกระดาษเป็นรูปเรือห่อหุ้มเมล็ดย่นๆ ที่ฐาน 1 เมล็ด นิเวศวิทยา อินเดีย ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู ชวา บอร์เนียว สุลาเวสี และฟิลิปปินส์ ในไทยพบทุกภาค ประโยชน์ ปลูกให้ร่มเงา ใช้แกะสลักในงานหัตถกรรม

**TALUTO** , scientific name Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr. Family name MALVACEAE Other names Po Khee Lin (Nong Khai) Po Khee Liat (Chiang Mai, Saraburi) Po Khee Had (Northern Chiang Mai) Kaphong Yai (Rayong) Kulukapaeng, Bugong (Malay, Pattani), Chin Hung (Phitsanulok), Khamrong (Malay, Pattani), Bon Krang (Ranong) Pong (Surat Thani) Kradang jute (Northern region) Chicken manure jute (Sukhothai) Chie Tak jute, common name Taluto. General Characteristics: A large deciduous tree, 20-30 meters tall, straight trunk, gray-brown outer bark. The bark is smooth or has tubercles scattered throughout the trunk. The inner bark is reddish brown and white, the bark is thick. 3-5 cm. Single leaves arranged in a circular arrangement. Leaves ovate or heart-shaped, 5-8 cm wide and long. 10-15 cm. The tip of the leaf is pointed or tapered. The leaf base is wedge-shaped or rounded or heart-shaped. The edge of the leaf is curly or wavy. branched inflorescences Born on the branch or at the end of the branch Light green flowers, calyx 5 petals, bell-shaped, petals split into 5 lobes, long sepals. about 2 cm, calyx lobe as long as the corolla tube, no petals, stamen core white-haired at the base, fruit 5-6 cm long, greyish-black, 3-5 fruits per stalk, each fruit having The thin, paper-like shell is shaped like a boat, covering the seed, wrinkled at the base of 1 seed. Ecology India Indochina region Malay Peninsula, Java, Borneo, Sulawesi and the Philippines in Thailand is found in every region. Benefits of planting for shade Used for carving in handicrafts.